


Carte de Score pour la Redevabilité et l'Action



Mesures

Produits de base : financement et contrôle budgétaire	
Prévisions de 2021 visant le financement de MILD (pourcentage du besoin)	73
Prévisions de 2021 visant le financement des TDR par le secteur public (pourcentage du besoin)	100
Prévisions de 2021 visant le financement des CTA par le secteur public (pourcentage du besoin)	100
Notation de la Banque mondiale concernant la gestion du secteur public et les institutions 2020 (CPIA groupe D)	▲ 3.4
Suivi de la résistance aux insecticides, mise en place et impact	
Cours sur les insecticides avec focus sur la résistance des moustiques dans des sites sentinelles représentatifs confirmés depuis 2010	4
Résistance aux insecticides suivie depuis 2015 et données déclarées à l'OMS	
Plan national de surveillance et de gestion de la résistance aux insecticides	
TDR en stock (stock >9 mois)	
CTA en stock (stock >9 mois)	
Campagne MILD/PID en bonne voie	
Le pays déclare avoir lancé la campagne "Zéro Palu ! Je m'engage"	
Échelle de mise en oeuvre de la PEC-C	
Couverture opérationnelle MILD/PID (% population à risque)	100
En bonne voie de réduire l'incidence de ≥40 % d'ici 2020 (par rapport à 2015)	
En bonne voie de réduire la mortalité de ≥40 % d'ici 2020 (par rapport à 2015)	
Indicateurs témoins de la santé maternelle et infantile et des MTN	
Couverture du traitement de masse contre les maladies tropicales négligées (indice MTN, %) (2019)	86
Estimation du pourcentage de la population atteinte du VIH et ayant accès à la thérapie antirétrovirale (2020)	72
Estimation du pourcentage d'enfants (0 à 14 ans) atteints du VIH et ayant accès à la thérapie antirétrovirale (2020)	17
% des accouchements assistés par un accoucheur ou une accoucheuse compétente	80
Soins postnatals (dans les 48 heures)	74
Allaitement maternel exclusif (% enfants < 6 mois)	50
Couverture Vitamine A 2018(2 doses)	99
Vaccins DTC3 2020 parmi les bébés de 0-11 mois	91

Légende

	Cible atteinte ou sur la bonne voie
	Progrès mais effort supplémentaire requis
	Pas en bonne voie
	Sans données
	Non applicable

Le paludisme affecte la totalité du Burkina Faso. La transmission est la plus intense dans la partie sud du pays. Les nombres annuels déclarés s'élèvent à 7 036 835 cas de paludisme en 2019 et 1 060 décès.

Paludisme

Maintenir les services de santé essentiels pendant la pandémie de COVID-19

Partout en Afrique, la pandémie de COVID-19 met les systèmes de santé à rude épreuve. Sous le fardeau additionnel qu'elle leur impose, ils doivent maintenir leurs services ordinaires contre les autres maladies. Afin de prévenir une morbidité et une mortalité étendues, il est indispensable de continuer à assurer la prestation d'interventions essentielles et vitales durant cette période difficile, comme celles de santé reproductive, maternelle, néonatale, adolescente et infantile, contre les maladies tropicales négligées et contre le paludisme.

L'OMS souligne l'importance critique d'efforts soutenus de prévention, détection et traitement du paludisme pendant la pandémie de COVID-19. Pour le Burkina Faso, il fallait absolument assurer que la chimioprévention du paludisme saisonnier (CPS) se déroule comme prévu en 2020, tout en respectant les normes de distanciation physique conformément à l'orientation et aux recommandations récentes de l'OMS. Le pays peut se féliciter d'avoir mis en œuvre avec succès la CPS. Sans la campagne de CPS, associée à la nécessité de maintenir les services de santé essentiels tels que la prise en charge des cas, une recrudescence des cas et de la mortalité associée au paludisme était à prévoir. Dans le pire des cas, l'OMS estimait qu'il pourrait y avoir une recrudescence de 10,3 % des cas de paludisme et de 73,9 % des décès imputables à la maladie au Burkina Faso. Il y aurait eu dans ce cas un renversement complet des progrès considérables de réduction de la mortalité enregistrés ces 20 dernières années dans la lutte contre le paludisme.

Il est essentiel d'assurer la continuité des services de lutte contre le paludisme, pour la SRMNIA et contre les MTN en 2021, tandis que la pandémie de COVID-19 continue d'impacter notre continent. L'approche pourra requérir la mise en œuvre de toutes les activités de rattrapage nécessaires et l'assurance d'une planification rapide pour parer aux éventuels retards d'approvisionnement et de livraison. Toute intervention doit assurer la sécurité des communautés et des travailleurs de la santé, étant donné la contagiosité de la COVID-19.

Progrès

Le Burkina Faso a élargi la couverture de la PCCi et s'est procuré suffisamment de MILD pour atteindre la couverture opérationnelle universelle de la population à risque ciblée. Le pays dispose de stocks suffisants de TDR pour 2021. Le Burkina Faso atteint une cote élevée concernant les systèmes de gestion du secteur public (Cluster D CPIA). Le pays surveille la résistance aux insecticides depuis 2015 et a déclaré les résultats de sa démarche à l'OMS. Il a récemment établi son plan de surveillance et gestion de la résistance aux insecticides. Le pays fait aussi preuve de leadership dans la lutte contre le paludisme en participant à l'approche « D'une charge élevée à un fort impact ».

Conformément au programme de la présidence d'ALMA, Son Excellence M. le Président Uhuru Kenyatta, le Burkina Faso a renforcé ses mécanismes de suivi et de redevabilité concernant le paludisme par l'élaboration de sa carte de score paludisme, laquelle est mise à jour régulièrement et partagée sur la plateforme Hub ALMA des cartes de score. Le pays est sur le point d'inaugurer son Conseil et Fonds pour l'élimination du paludisme.

Impact

Les nombres annuels déclarés s'élèvent à 7 036 835 cas de paludisme en 2019 et 1 060 décès.

Principaux problèmes et difficultés

- La résistance aux insecticides menace l'efficacité du contrôle des vecteurs.
- Maintien des interventions essentielles et vitales pendant la pandémie de COVID-19, notamment de santé reproductive, maternelle, néonatale, adolescente et infantile, contre le paludisme et contre les maladies tropicales négligées.

Mesure clé recommandée précédemment

Objectif	Mesure	Délai d'accomplissement suggéré	Progrès	Commentaires - activités/accomplissements clés depuis le dernier rapport trimestriel
Impact	Assurer le maintien et la mise en œuvre des services contre le paludisme, y compris la prise en charge des cas et le contrôle des vecteurs, conformément aux directives appropriées pendant la pandémie de COVID-19.	T4 2020 Impact		La continuité des services ordinaires, après un déclin de l'approvisionnement et de l'adoption, s'est progressivement rétablie. Des activités de sensibilisation et la mise en œuvre des campagnes de distribution ont été maintenues sous mesures de protection du personnel et des bénéficiaires. Quelques retards de livraison de produits essentiels ont été observés mais il n'y a pas eu de ruptures de stocks majeures au niveau des formations sanitaires ou de la communauté et les stocks sont actuellement suffisants dans le pays et dans les canaux de livraison. L'apport d'EPI pour les campagnes a été assuré par les partenaires, y compris à travers la proposition C19RM pour les années à venir. La campagne IRS 2021 a été accomplie avec succès et la CPS a été mise en œuvre comme prévu.

SRMNIA et MTN

Progrès

Le Burkina Faso a bien progressé aussi sur le plan des interventions témoins de la SRMNIA, notamment en ce qui concerne le DTC3, l'allaitement maternel exclusif et l'assistance à l'accouchement par un personnel de santé qualifié. Le Burkina Faso a amélioré considérablement ses mécanismes de suivi et de redevabilité par la mise au point d'une carte de Score de Santé maternelle, néonatale, infantile et adolescente.

Les progrès réalisés sur le plan des maladies tropicales négligées (MTN) au Burkina Faso se mesurent au moyen d'un indice composite calculé d'après la couverture de la chimiothérapie préventive atteinte pour la filariose lymphatique, l'onchocercose, la schistosomiase et le trachome. La couverture de la chimiothérapie préventive au Burkina Faso est élevée pour le trachome (100 %), la schistosomiase (83 %), l'onchocercose (82 %) et la filariose lymphatique (80 %). Globalement, l'indice de couverture de la

chimiothérapie préventive des MTN au Burkina Faso en 2019 est de 86, en légère baisse par rapport à l'indice 2018 (89).

Mesures clés recommandées précédemment

Objectif	Mesure	Délai d'accomplissement suggéré	Progrès	Commentaires - activités/accomplissements clés depuis le dernier rapport trimestriel
SRMNIA ¹ : Impact	Assurer le maintien et la mise en œuvre des services SRMNIA essentiels conformément aux directives appropriées pendant la pandémie de COVID-19. Résoudre les ruptures de stocks de produits essentiels de SRMNIA.	T4 2020		Le ministère de la Santé burkinabè a formé des agents de terrain sur la COVID-19 et établi des postes de triage dans tous les hôpitaux universitaires, régionaux et de district de santé. Un équipement EPI a été fourni au personnel de santé (masques, gants, blouses et gels hydroalcooliques). Des directives techniques de maintien de la prestation des services et soins de SRMNIA dans le contexte de la COVID-19 ont été élaborées et leur mise en œuvre est suivie et surveillée. Les indicateurs de santé se sont détériorés pendant l'année 2020. Par exemple, le taux d'assistance à l'accouchement par un personnel de santé qualifié est passé de 79 % en 2019 à 77 % et l'indicateur de consultation prénatale CPN4, de 39 % à 38 %, tandis que le taux de mortalité maternelle en milieu hospitalier augmentait et passait de 50 pour 1 000 et 64 pour 1 000.
MTN	Assurer le maintien et la mise en œuvre des interventions MTN (DMM, contrôle des vecteurs et gestion de la morbidité et prévention de l'invalidité) dans le respect des directives appropriées pendant la pandémie de COVID-19, avec notamment priorisation des activités de rattrapage nécessaires clés.	T4 2021		De mars 2020 à ce jour, le pays a pu maintenir la mise en œuvre des interventions essentielles contre les MTN malgré le retard ayant affecté la planification initiale, dans le respect des mesures de prévention de la COVID-19. Au T3 2021, le pays a mis l'accent sur les études d'évaluation de la transmission de la filariose lymphatique et toutes les activités ordinaires contre les MTN sont également menées comme prévu.

Le Burkina Faso a répondu favorablement à la mesure de SRMNIA recommandée pour résoudre le problème de la faible couverture de la thérapie antirétrovirale chez les enfants et continue à suivre les progrès des interventions mises en œuvre.

¹Mesures de SRMNIA, mesures recommandées et réponse suivies par l'OMS.

Légende

	Mesure accomplie
	Progrès
	Pas de progrès
	Résultat non encore échu.