


Carte de Score pour la Redevabilité et l'Action



Mesures

| Produits de base : financement et contrôle budgétaire | |
|--|-----|
| Prévisions de 2021 visant le financement de MILD (pourcentage du besoin) | 100 |
| Prévisions de 2021 visant le financement des TDR par le secteur public (pourcentage du besoin) | 100 |
| Prévisions de 2021 visant le financement des CTA par le secteur public (pourcentage du besoin) | 100 |
| Notation de la Banque mondiale concernant la gestion du secteur public et les institutions 2020 (CPIA groupe D) | 3.5 |
| Suivi de la résistance aux insecticides, mise en place et impact | |
| Cours sur les insecticides avec focus sur la résistance des moustiques dans des sites sentinelles représentatifs confirmés depuis 2010 | 4 |
| Résistance aux insecticides suivie depuis 2015 et données déclarées à l'OMS | |
| Plan national de surveillance et de gestion de la résistance aux insecticides | |
| TDR en stock (stock >9 mois) | |
| CTA en stock (stock >9 mois) | |
| Campagne MILD/PID en bonne voie | |
| Le pays déclare avoir lancé la campagne "Zéro Palu ! Je m'engage" | |
| Échelle de mise en oeuvre de la PEC-C | |
| Couverture opérationnelle MILD/PID (% population à risque) | 100 |
| En bonne voie de réduire l'incidence de ≥40 % d'ici 2020 (par rapport à 2015) | |
| En bonne voie de réduire la mortalité de ≥40 % d'ici 2020 (par rapport à 2015) | |
| Indicateurs témoins de la santé maternelle et infantile et des MTN | |
| Couverture du traitement de masse contre les maladies tropicales négligées (indice MTN, %) (2019) | 65 |
| Estimation du pourcentage de la population atteinte du VIH et ayant accès à la thérapie antirétrovirale (2020) | 74 |
| Estimation du pourcentage d'enfants (0 à 14 ans) atteints du VIH et ayant accès à la thérapie antirétrovirale (2020) | 49 |
| % des accouchements assistés par un accoucheur ou une accoucheuse compétente | 74 |
| Soins postnataux (dans les 48 heures) | 80 |
| Allaitement maternel exclusif (% enfants < 6 mois) | 23 |
| Couverture Vitamine A 2018(2 doses) | 84 |
| Vaccins DTC3 2020 parmi les bébés de 0-11 mois | 80 |

La transmission du paludisme se produit toute l'année en Côte d'Ivoire, bien qu'elle soit plus saisonnière dans le nord du pays. Les nombres annuels déclarés s'élèvent à 5 950 336 cas de paludisme en 2019 et 1 693 décès.

Légende

| | |
|--|---|
| | Cible atteinte ou sur la bonne voie |
| | Progrès mais effort supplémentaire requis |
| | Pas en bonne voie |
| | Sans données |
| | Non applicable |

Paludisme

Maintenir les services de santé essentiels pendant la pandémie de COVID-19

Partout en Afrique, la pandémie de COVID-19 met les systèmes de santé à rude épreuve. Sous le fardeau additionnel qu'elle leur impose, ils doivent maintenir leurs services ordinaires contre les autres maladies. Afin de prévenir une morbidité et une mortalité étendues, il est indispensable de continuer à assurer la prestation d'interventions essentielles et vitales durant cette période difficile, comme celles de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et adolescente, contre les maladies tropicales négligées et contre le paludisme.

L'OMS souligne l'importance critique d'efforts soutenus de prévention, détection et traitement du paludisme pendant la pandémie de COVID-19. Il était crucial d'assurer la continuité des services de prévention et de traitement du paludisme, y compris la distribution de moustiquaires imprégnées d'insecticide et la pulvérisation intradomestique à effet rémanent, de même que la chimioprévention chez les femmes enceintes et les enfants en bas âge (par traitement préventif intermittent pendant la grossesse et chimioprévention du paludisme saisonnier). Dans le pire des cas, où toutes les campagnes de distribution de MII auraient été interrompues, avec une réduction de 75 % de l'accès aux médicaments antipaludiques efficaces, l'OMS estime qu'il aurait pu y avoir une recrudescence de 23,2 % des cas de paludisme et de 111,4 % des décès imputables à la maladie en Côte d'Ivoire. Il s'agirait là d'un renversement complet des progrès considérables de réduction de la mortalité enregistrés ces 20 dernières années dans la lutte contre le paludisme.

Il est essentiel d'assurer la continuité des services de lutte contre le paludisme, pour la SRMNIA et contre les MTN en 2021, tandis que la pandémie de COVID-19 continue d'impacter notre continent. L'approche pourra requérir la mise en œuvre de toutes les activités de rattrapage nécessaires et l'assurance d'une planification rapide pour parer aux éventuels retards d'approvisionnement et de livraison. Toute intervention doit assurer la sécurité des communautés et des travailleurs de la santé, étant donné la contagiosité de la COVID-19.

Progrès

La Côte d'Ivoire a réussi à mobiliser les ressources nécessaires au financement des MILD, TDR et CTA en 2021 et s'est assurée un approvisionnement suffisant en MILD pour atteindre la couverture MILD opérationnelle à 100 % de la population à risque ciblée. Le pays a également élargi la mise en œuvre de la PCCi. Il dispose de stocks suffisants de CTA et de TDR et les campagnes IRS et MILD ont été accomplies avec succès. La Côte d'Ivoire a récemment présenté les résultats de ses tests de résistance aux insecticides à l'OMS. Le pays a atteint une cote élevée en termes de systèmes de gestion du secteur public (Cluster D CPIA). Le pays a inauguré la campagne « Zéro Palu ! Je m'engage ».

Conformément au programme de la présidence d'ALMA, Son Excellence M. le Président Uhuru Kenyatta, la Côte d'Ivoire a renforcé ses mécanismes de suivi et de redevabilité concernant le paludisme par l'élaboration d'une carte de score paludisme, non encore partagée toutefois sur la plateforme Hub ALMA des cartes de score.

Impact

Les nombres annuels déclarés s'élèvent à 5 950 336 cas de paludisme en 2019 et 1 693 décès.

Problème principal

- Maintien des interventions essentielles et vitales pendant la pandémie de COVID-19, notamment de santé reproductive, maternelle, néonatale, adolescente et infantile, contre le paludisme et contre les MTN.

Mesures clés recommandées précédemment

| Objectif | Mesure | Délai d'accomplissement suggéré | Progrès | Commentaires - activités/accomplissements clés depuis le dernier rapport trimestriel |
|----------|--|---------------------------------|---------|---|
| Impact | Assurer le maintien et la mise en œuvre des services contre le paludisme, y compris la prise en charge des cas et le contrôle des vecteurs, conformément aux directives appropriées pendant la pandémie de COVID-19. | T4 2020 | | Le pays a accéléré ses livraisons de CTA et dispose de stocks adéquats de TDR comme de CTA. Les campagnes IRS et MILD ont toutes deux été menées avec succès. La crise de la COVID-19 a donné lieu à une utilisation réduite des structures sanitaires et des agents de santé communautaire en 2020 car, faute de formation et d'EPI, ces agents de santé n'ont pas pu assurer la continuité des services de base essentiels. La situation se reflète dans l'amointrissement des cas de paludisme soupçonnés, des cas soupçonnés testés et du nombre de cas traités dans la communauté. La réduction des cas testés et traités tient aussi aux perturbations de l'approvisionnement en TDR et en CTA en 2020, du fait des difficultés générales de la chaîne d'approvisionnement. Les EPI et la sensibilisation à la COVID-19 ont été intégrés à la prestation des services communautaires contre le paludisme. |

SRMNIA et MTN

Progrès

Le pays a progressé sur le plan de l'intervention témoin de la SRMNIA relative aux soins postnatals et a accru récemment sa couverture de la vitamine A et de la thérapie antirétrovirale. La Côte d'Ivoire a amélioré ses mécanismes de suivi et de redevabilité par la mise au point d'une carte de Score de Santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et adolescente.

Les progrès réalisés sur le plan des maladies tropicales négligées (MTN) en Côte d'Ivoire se mesurent au moyen d'un indice composite calculé d'après la couverture de la chimiothérapie préventive atteinte pour l'onchocercose, la schistosomiase, les géohelminthiases, la filariose lymphatique et le trachome. La couverture de la chimiothérapie préventive en Côte d'Ivoire est élevée pour l'onchocercose (95 %) et pour les géohelminthiases (92 %). Elle est de 74 % pour la filariose lymphatique, de 54 % pour la schistosomiase et de 33 % pour le trachome. Globalement, l'indice de couverture de la

chimiothérapie préventive des MTN en Côte d'Ivoire en 2019 est de 65, en hausse nette par rapport à la valeur d'indice 2018 (21).


Mesures clés recommandées précédemment

| Objectif | Mesure | Délai d'accomplissement suggéré | Progrès | Commentaires - activités/accomplissements clés depuis le dernier rapport trimestriel |
|---|--|---------------------------------|---------|---|
| SRMNIA ¹ : Optimiser la qualité des soins. | a) Résoudre le problème de la couverture en baisse de la vitamine A. | T1 2021 | | Sans rapport d'avancement. |
| | b) Assurer le maintien et la mise en œuvre des services SRMNIA essentiels conformément aux directives appropriées pendant la pandémie de COVID-19. Résoudre les ruptures de stocks de produits essentiels de SRMNIA. | T4 2020 | | Le pays fait état d'une baisse considérable de la demande et de l'utilisation des services de santé durant la première moitié de l'année 2020 (15 à 30 % de réduction des CPN1, des activités de planification familiale, des consultations de traitement, des hospitalisations et des interventions chirurgicales ; 20 % de réduction de la couverture vaccinale pour la troisième dose du vaccin pentavalent). La demande et l'utilisation des services de santé sont depuis lors en hausse. Les ONG et les organisations à base communautaire ont mené des activités de sensibilisation et de communication de masse concernant la COVID-19 (conception et distribution de supports de communication, annonces radiophoniques, feuilles d'information illustrées, guides illustrés, affiches, messages publiés dans les médias sociaux et sur les plateformes numériques, etc.) Des EPI ont été distribués aux agents de santé communautaire, avec financement d'EPI supplémentaires à travers le C19RM. |
| MTN | Assurer le maintien et la mise en œuvre des interventions MTN (distribution massive de médicaments, contrôle des vecteurs et gestion de la morbidité et prévention de l'invalidité) conformément aux | T4 2021 | | Sans rapport d'avancement. |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | directives appropriées pendant la pandémie de COVID-19, avec notamment priorisation des activités de rattrapage nécessaires clés. | | | |
|--|---|--|--|--|

La Côte d'Ivoire a répondu favorablement à la mesure de SRMNIA recommandée pour résoudre le problème de la faible couverture de l'allaitement maternel exclusif, et elle continue à suivre les progrès de l'intervention mise en œuvre.

Légende

| | |
|---|---------------------------|
|  | Mesure accomplie |
|  | Progrès |
|  | Pas de progrès |
|  | Résultat non encore échu. |

Mesures de SRMNIA, mesures recommandées et réponse suivies par l'OMS.