


## Carte de Score pour la Redevabilité et l'Action



La population entière du Gabon court un risque élevé de contraction du paludisme. La transmission est intense toute l'année dans le nord du pays ; elle est plus saisonnière dans le sud. Les nombres annuels déclarés s'élèvent à 797 278 cas de paludisme en 2018 et 591 décès.

### Mesures

| Produits de base : financement et contrôle budgétaire   |  |    |
|---|--|----|
| Prévisions de 2020 visant le financement de MILD (pourcentage du besoin)  |  | 0  |
| Prévisions de 2020 visant le financement des TDR par le secteur public (pourcentage du besoin)                  |  | 0  |
| Prévisions de 2020 visant le financement des CTA par le secteur public (pourcentage du besoin)                  |  | 80 |
| Notation de la Banque mondiale concernant la gestion du secteur public et les institutions 2018 (CPIA groupe D) |  |    |

| Suivi de la résistance aux insecticides, mise en place et impact   |   |    |
|--|---|----|
| Cours sur les insecticides avec focus sur la résistance des moustiques dans des sites sentinelles représentatifs confirmés depuis 2010 |   | 2  |
| Résistance aux insecticides suivie depuis 2015 et données déclarées à l'OMS  |   |    |
| Plan national de surveillance et de gestion de la résistance aux insecticides  |   |    |
| Le pays déclare avoir lancé la campagne "Zéro Palu ! Je m'engage "   |   |    |
| Échelle de mise en oeuvre de la PEC-C (2017)   |   |    |
| Couverture opérationnelle MILD/PID (% population à risque)   | ▲ | 11 |
| En bonne voie de réduire l'incidence de ≥40 % d'ici 2020 (par rapport à 2015)  |   |    |
| En bonne voie de réduire la mortalité de ≥40 % d'ici 2020 (par rapport à 2015)   |   |    |

| Indicateurs témoins de la santé maternelle et infantile et des MTN   |  |    |
|--|--|----|
| Couverture du traitement de masse contre les maladies tropicales négligées (indice MTN, %) (2018)                    |  | 2  |
| Estimation du pourcentage de la population atteinte du VIH et ayant accès à la thérapie antirétrovirale (2018)       |  | 67 |
| Estimation du pourcentage d'enfants (0 à 14 ans) atteints du VIH et ayant accès à la thérapie antirétrovirale (2018) |  | 57 |
| % des accouchements assistés par un accoucheur ou une accoucheuse compétente   |  | 89 |
| Soins postnatals (dans les 48 heures)  |  | 60 |
| Allaitement maternel exclusif (% enfants < 6 mois)   |  | 5  |
| Couverture Vitamine A 2018(2 doses)  |  | 0  |
| Vaccins DTC3 2018 parmi les bébés de 0-11 mois   |  | 70 |

### Légende

|  |   |
|--|---|
|  | Cible atteinte ou sur la bonne voie       |
|  | Progrès mais effort supplémentaire requis |
|  | Pas en bonne voie                         |
|  | Sans données                              |
|  | Non applicable                            |

## **Paludisme**

### **Maintenir les services de santé essentiels pendant la pandémie de COVID-19**

Partout en Afrique, la pandémie de COVID-19 met les systèmes de santé à rude épreuve. Sous le fardeau additionnel qu'elle leur impose, ils doivent maintenir leurs services ordinaires contre les autres maladies. Afin de prévenir une morbidité et une mortalité étendues, il est indispensable de continuer à assurer la prestation d'interventions essentielles et vitales durant cette période difficile, comme celles de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et adolescente, y compris contre le paludisme.

L'OMS souligne l'importance critique d'efforts soutenus de prévention, détection et traitement du paludisme pendant la pandémie de COVID-19. Il est crucial d'assurer la continuité des services de prévention et de traitement du paludisme, y compris la distribution de moustiquaires imprégnées d'insecticide et la pulvérisation intradomiciliaire à effet rémanent. Toute intervention doit considérer l'importance de la baisse de la mortalité imputable au paludisme aussi bien que la sécurité des communautés et des travailleurs de la santé, étant donné la contagiosité de COVID-19.

Le Gabon est encouragé à maintenir ses services de santé essentiels, y compris la prise en charge des cas de paludisme, pendant la pandémie de COVID-19. Dans le pire des cas, où l'on aurait une réduction de 75 % de l'accès aux médicaments antipaludiques efficaces, l'OMS estime qu'il pourrait y avoir une recrudescence de 1,5 % des cas de paludisme et de 117 % des décès imputables à la maladie au Gabon. Il s'agirait là d'un renversement complet des progrès considérables de réduction de la mortalité enregistrés ces 20 dernières années dans la lutte contre le paludisme.

### **Progrès**

Le Gabon a récemment soumis les résultats de ses tests de résistance aux insecticides à l'OMS. Le pays déclare que la majorité de la population accède aux TDR et CTA à travers le régime d'assurance santé.

### **Impact**

Les nombres annuels déclarés s'élèvent à 797 278 cas de paludisme en 2018 et 591 décès.

### **Principaux problèmes et difficultés**

- Ressources insuffisantes à l'accès à une couverture élevée des interventions essentielles de lutte contre le paludisme.
- Maintien des interventions essentielles et vitales pendant la pandémie de COVID-19, notamment de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et adolescente, y compris contre le paludisme.

## Mesures clés recommandées précédemment

| Objectif  | Mesure   | Délai d'accomplissement suggéré | Progrès | Commentaires - activités/accomplissements clés depuis le dernier rapport trimestriel  |
|---|--|---------------------------------|---------|---|
| Résoudre le problème de la couverture du contrôle des vecteurs. | Résoudre le problème d'affaiblissement de la couverture du contrôle des vecteurs.  | T1 2014                         |         | Le pays s'est procuré plus de 100 000 MILD au dernier trimestre 2019.   |
| Contrôle des vecteurs   | Déclarer l'état de la résistance aux insecticides et de sa surveillance et finaliser et mettre en œuvre le plan national de surveillance et gestion de la résistance aux insecticides. | T1 2017                         |         | La surveillance entomologique a été entreprise et une sensibilité réduite aux pyréthroïdes est rapportée. L'OMS se tient prête à apporter une assistance technique à la mise au point du plan de surveillance et gestion de la résistance aux insecticides et pour étendre la surveillance à d'autres sites. Les plans du Gabon concernant la cartographie vectorielle dans les cinq strates du pays n'ont pas été mis en œuvre faute de financement, mais le pays travaille à l'établissement d'une stratégie de mobilisation de ressources. |
| Optimiser la qualité des soins.                                 | Fournir les données sur l'élargissement de la mise en œuvre PCCi à l'échelle du pays.  | T1 2017                         |         | Le pays entend élargir la PCCi avec la formation de 2000 ASC sur l'ensemble du pays. La mise en œuvre requiert toutefois la mobilisation d'un budget de 2,9 millions d'euros.   |
| Impact  | Rechercher et résoudre les raisons pour lesquelles l'OMS a estimé une hausse du taux d'incidence du paludisme.   | T4 2017                         |         | Le Gabon déclare une couverture des interventions essentielles de lutte contre le paludisme en baisse depuis la perte de financement du Fonds mondial en 2010. La couverture de toutes les interventions antipaludiques, MILD compris, est en baisse faute de financement suffisant. Le pays a révisé son Plan stratégique 2018-2021 contre le paludisme et s'en sert au soutien de la mobilisation de ressources.  |

Le Gabon a répondu aux mesures recommandées concernant le financement des antipaludiques et continue de suivre les progrès des interventions mises en œuvre.

## Nouvelle mesure clé recommandée

| Objectif | Mesure   | Délai d'accomplissement suggéré |
|----------|--|---------------------------------|
| Impact   | Assurer le maintien et la mise en œuvre des services contre le paludisme, y compris la prise en charge des cas et le contrôle des vecteurs, conformément aux directives appropriées pendant la pandémie de COVID-19. | T4 2020                         |

## SRMNIA et MTN

### Progrès

Le Gabon a atteint une haute couverture au niveau des interventions témoins de la SRMNIA relatives à l'assistance à l'accouchement par un personnel de santé qualifié et a récemment accru sa couverture des thérapies antirétrovirales chez les enfants.

Les progrès réalisés sur le plan des maladies tropicales négligées (MTN) au Gabon sont indiqués par un indice composite calculé d'après la couverture de la chimiothérapie préventive atteinte pour la filariose lymphatique, l'onchocercose, la schistosomiase et les géohelminthiases. La couverture de la chimiothérapie préventive est élevée pour la schistosomiase (100 %) mais elle est faible pour les géohelminthiases (27 %). Le pays n'a pas déclaré de couverture de chimiothérapie préventive pour la filariose et l'onchocercose. Globalement, l'indice de couverture de la chimiothérapie préventive des MTN au Gabon en 2018 est faible (2), en légère hausse par rapport à la valeur d'indice 2017 (0).

### Mesures clés recommandées précédemment





| Objectif  | Mesure  | Délai d'accomplissement suggéré | Progrès | Commentaires - activités/accomplissements clés depuis le dernier rapport trimestriel   |
|---|---|---------------------------------|---------|--|
| MTN   | Clarifier l'épidémiologie des maladies sujettes à la chimiothérapie préventive et entreprendre un programme de chimiothérapie préventive contre les MTN là où elle est nécessaire, avec mise en œuvre annuelle systématique de tous les composants dans tous les groupes à risque comme recommandé par l'OMS. | T4 2018                         |         | D'après la prévalence obtenue de la cartographie de la schistosomiase, le pays devra effectuer une chimiothérapie préventive tous les deux ans. La DMM 2020 vient d'être accomplie pour les géohelminthiases et la préparation du rapport est en cours.  |
| SRMNIA <sup>1</sup> : Optimiser la qualité des soins. | Rechercher et résoudre les raisons du manque de données déclarées sur la couverture de la vitamine A.   | T2 2019                         |         | Sans rapport d'avancement.   |
| MTN   | Soumettre les données de chimiothérapie préventive pour la filariose lymphatique et l'onchocercose et chercher à accroître la CP des géohelminthiases pour atteindre les cibles de l'OMS.   | T2 2020                         |         | Pour la filariose lymphatique, le pays attend toujours les résultats de l'analyse PCR et mobilise les fonds nécessaires à la reprise de la cartographie. Pour l'onchocercose et la loase, trois districts d'hypoendémie sur neuf ont effectué une recherche opérationnelle afin de déterminer les effets secondaires éventuels liés à l'ivermectine. Le pays mobilise les fonds nécessaires pour les six districts restants. La DMM pour la FL est prévue en 2021. |

Le Gabon a répondu favorablement aux mesures de SRMNIA recommandées pour résoudre le problème de la faible couverture de l'allaitement maternel exclusif et continue à suivre les progrès de l'intervention mise en œuvre.

## Nouvelle mesure clé recommandée

| Objectif                     | Mesure  | Délai d'accomplissement suggéré |
|------------------------------|---|---------------------------------|
| SRMNIA <sup>1</sup> : Impact | Assurer le maintien et la mise en œuvre des services SRMNIA essentiels conformément aux directives appropriées pendant la pandémie de COVID-19. | T4 2020                         |

### Légende

|   |                           |
|---|---------------------------|
|  | Mesure accomplie          |
|  | Progrès                   |
|  | Pas de progrès            |
|  | Résultat non encore échu. |

---

<sup>1</sup>Mesures de SRMNIA, mesures recommandées et réponse suivies par l'OMS.