


Carte de Score pour la Redevabilité et l'Action








La transmission du paludisme intervient toute l'année au Cameroun. Elle est la plus intense dans le sud du pays. Les nombres annuels déclarés s'élèvent à 1 790 891 cas de paludisme en 2016 et 2 639 décès.

Mesures

Produits de base : financement et contrôle budgétaire	
Prévisions de 2017 visant le financement de MILD (pourcentage du besoin)	80
Prévisions de 2017 visant le financement des TDR par le secteur public (pourcentage du besoin)	82
Prévisions de 2017 visant le financement des CTA par le secteur public (pourcentage du besoin)	100
Notation de la Banque mondiale concernant la gestion du secteur public et les institutions 2016 (CPIA groupe D)	3.0
Suivi de la résistance aux insecticides, mise en place et impact	
Cours sur les insecticides avec focus sur la résistance des moustiques dans des sites sentinelles représentatifs confirmés depuis 2010	3
Résistance aux insecticides suivie depuis 2015 et données déclarées à l'OMS	
Plan national de surveillance et de gestion de la résistance aux insecticides	
Échelle de mise en oeuvre de la PEC-C (2016)	
Couverture opérationnelle MILD/PID (% population à risque)	100
Changement estimé du taux d'incidence du paludisme (2010-2016)	
Indicateurs témoins de la santé maternelle et infantile et des MTN	
Couverture du traitement de masse contre les maladies tropicales négligées (indice MTN, %) (2016)	58
Estimation du pourcentage de la population atteinte du VIH et ayant accès à la thérapie antirétrovirale (2016)	37
Estimation du pourcentage d'enfants (0 à 14 ans) atteints du VIH et ayant accès à la thérapie antirétrovirale (2016)	18
% des accouchements assistés par un accoucheur ou une accoucheuse compétente	65
Soins postnataux (dans les 48 heures)	65
Allaitement maternel exclusif (% enfants < 6 mois)	28
Couverture Vitamine A 2015(2 doses)	99
Vaccins DTC3 2016 parmi les bébés de 0-11 mois	85

Légende

	Cible atteinte ou sur la bonne voie
	Progrès mais effort supplémentaire requis
	Pas en bonne voie
	Sans données
	Non applicable

Paludisme

Progrès

Le Cameroun s'est assuré des ressources suffisantes pour couvrir une bonne partie des coûts des MILD, CTA et TDR requis en 2017. Le Cameroun a élargi la mise en œuvre de la PCCi et distribué suffisamment de MILD pour atteindre la couverture opérationnelle universelle. Le pays surveille la résistance aux insecticides depuis 2015 et a déclaré les résultats de sa démarche à l'OMS. Le Cameroun a amélioré considérablement ses mécanismes de suivi et de redevabilité par la mise au point d'une carte de score pour le contrôle du paludisme.

Impact

Les nombres annuels déclarés s'élèvent à 1 790 891 cas de paludisme en 2016 et 2 639 décès.

Principaux problèmes et difficultés

- Assurer le maintien et l'accroissement des ressources domestiques affectées à la lutte contre le paludisme.
- Le taux de déclaration des cas de paludisme par les systèmes de surveillance est inférieur à 40% dans le pays.

Mesure clé recommandée précédemment

Objectif	Mesure	Délai d'accomplissement suggéré	Progrès	Commentaires - activités/ accomplissements clés depuis le dernier rapport trimestriel
Résoudre la question du financement.	Accélérer la signature de la subvention du FM.	T4 2017		Le pays a rempli les conditions requises pour l'approbation de la subvention.

SMI et MTN

Progrès

Le pays a atteint une couverture élevée au niveau de l'intervention de SMI témoin relative à la vitamine A et a accru récemment sa couverture de la thérapie antirétrovirale au niveau de sa population globale.

Les progrès réalisés sur le plan des maladies tropicales négligées (MTN) au Cameroun se mesurent au moyen d'un indice composite calculé d'après la couverture de la chimiothérapie préventive atteinte pour la filariose lymphatique, l'onchocercose, la schistosomiase, les géohelminthiases et le trachome. La couverture de la chimiothérapie préventive au Cameroun est élevée pour l'onchocercose (75 %) et la schistosomiase (77 %). Elle est bonne pour la filariose lymphatique (71 %) et pour les géohelminthiases (61 %), mais elle est faible pour le trachome (26 %). Globalement, l'indice de couverture de la chimiothérapie préventive des MTN au Cameroun en 2016 est de 58, en hausse nette par rapport à la valeur d'indice 2015 (20).

Mesure clé recommandée précédemment

Le pays a répondu favorablement à la mesure recommandée précédemment pour accélérer la couverture de la thérapie antirétrovirale dans la population globale et chez les enfants de moins de 14 ans.

Légende

	Mesure accomplie
	Progrès
	Pas de progrès
	Résultat non encore échu