


Carte de Score pour la Redevabilité et l'Action



La transmission du paludisme au Tchad est intense dans le sud du pays. Les nombres annuels déclarés s'élèvent à 1 962 372 cas de paludisme en 2017 et 2 088 décès.

Mesures

Produits de base : financement et contrôle budgétaire	
Prévisions de 2019 visant le financement de MILD (pourcentage du besoin)	100
Prévisions de 2019 visant le financement des TDR par le secteur public (pourcentage du besoin)	100
Prévisions de 2019 visant le financement des CTA par le secteur public (pourcentage du besoin)	87
Notation de la Banque mondiale concernant la gestion du secteur public et les institutions 2017 (CPIA groupe D)	2.7
Suivi de la résistance aux insecticides, mise en place et impact	
Cours sur les insecticides avec focus sur la résistance des moustiques dans des sites sentinelles représentatifs confirmés depuis 2010	2
Résistance aux insecticides suivie depuis 2015 et données déclarées à l'OMS	
Plan national de surveillance et de gestion de la résistance aux insecticides	
Échelle de mise en oeuvre de la PEC-C (2017)	
Couverture opérationnelle MILD/PID (% population à risque)	100
Changement de l'incidence estimée du paludisme (2010–2017)	
Changement des taux de mortalité estimés du paludisme (2010–2017)	
Indicateurs témoins de la santé maternelle et infantile et des MTN	
Couverture du traitement de masse contre les maladies tropicales négligées (indice MTN, %) (2017)	
Estimation du pourcentage de la population atteinte du VIH et ayant accès à la thérapie antirétrovirale (2017)	45
Estimation du pourcentage d'enfants (0 à 14 ans) atteints du VIH et ayant accès à la thérapie antirétrovirale (2017)	18
% des accouchements assistés par un accoucheur ou une accoucheuse compétente	20
Soins postnataux (dans les 48 heures)	16
Allaitement maternel exclusif (% enfants < 6 mois)	1
Couverture Vitamine A 2016 (2 doses)	0
Vaccins DTC3 2017 parmi les bébés de 0-11 mois	41

Légende

	Cible atteinte ou sur la bonne voie
	Progrès mais effort supplémentaire requis
	Pas en bonne voie
	Sans données
	Non applicable

Paludisme

Progrès

Le Tchad s'est assuré les ressources nécessaires à l'obtention des MILD, TDR et de la plupart des CTA requis en 2019. Le pays s'est assuré un approvisionnement suffisant en MILD pour atteindre la couverture universelle opérationnelle. Le pays a amélioré considérablement ses mécanismes de suivi et de redevabilité par la mise au point d'une Carte de score Paludisme. Le Tchad a réduit son taux estimé de mortalité du paludisme de plus de 40 % depuis 2010.

Impact

Les nombres annuels déclarés s'élèvent à 1 962 372 cas de paludisme en 2017 et 2 088 décès.

Principaux problèmes et difficultés

- Faiblesse du système d'information sanitaire.
- Insuffisance de ressources pour la pleine mise en œuvre le plan stratégique national.

Mesures clés recommandées précédemment

Objectif	Mesure	Délai d'accomplissement suggéré	Progrès	Commentaires - activités/accomplissements clés depuis le dernier rapport trimestriel
Contrôle des vecteurs	Étant donné la résistance déclarée des moustiques à deux classes d'insecticides, finaliser de toute urgence et mettre en œuvre le plan national de surveillance et gestion de la résistance aux insecticides.	T1 2017		Le Tchad a élaboré son plan de surveillance et gestion de la résistance aux insecticides.
Contrôle des vecteurs	Déclarer à l'OMS l'état de la surveillance de la résistance aux insecticides.	T3 2018		Le Tchad a détecté une résistance aux pyréthroïdes et au DDT. L'insuffisance de fonds a retardé la surveillance de la résistance des carbamates.

SRMNIA et MTN

Progrès

Le pays a amélioré ses mécanismes de suivi et de redevabilité par la mise au point d'une Carte de Score de Santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile.

Les progrès réalisés sur le plan des maladies tropicales négligées (MTN) au Tchad se mesurent au moyen d'un indice composite calculé d'après la couverture de la chimiothérapie préventive atteinte pour la filariose lymphatique, l'onchocercose, la schistosomiase, les géohelminthiases et le trachome. La couverture de la chimiothérapie préventive au Tchad est élevée pour le trachome (92 %), bonne pour la filariose lymphatique (68 %) et l'onchocercose (66 %) ; elle atteint 58 % pour la schistosomiase et est faible pour les géohelminthiases (48%). Globalement, l'indice de couverture de la chimiothérapie préventive des MTN au Tchad en 2017 est de 65, en très nette hausse par rapport à la valeur d'indice 2016 (10).

Mesures clés recommandées précédemment

Objectif	Mesure	Délai d'accomplissement suggéré	Progrès	Commentaires - activités/accomplissements clés depuis le dernier rapport trimestriel
MTN	a) À titre prioritaire, soumettre à l'OMS les données de couverture de la chimiothérapie préventive (CP) concernant la schistosomiase, l'onchocercose et la filariose lymphatique.	T1 2019		Le pays a soumis des données de couverture de la chimiothérapie préventive concernant la schistosomiase, l'onchocercose et la filariose lymphatique et a atteint une couverture élevée.
	b) Déterminer les zones d'élimination sous-nationale de l'onchocercose pour identifier s'il existe des zones où la DMM pourrait potentiellement être arrêtée. Déterminer aussi si la prévalence des géohelminthiases (GH) est inférieure à 20 %, ce qui permettrait un traitement au cas par cas.	T3 2019		Le Tchad mène une campagne de chimiothérapie préventive intégrée contre l'onchocercose, la filariose lymphatique, les géohelminthiases et la schistosomiase dans les zones d'endémie de l'onchocercose et de la filariose lymphatique.

Le Tchad a répondu favorablement aux mesures recommandées pour résoudre le problème de l'assistance à l'accouchement par un personnel de santé qualifié, de la vitamine A, de l'allaitement maternel exclusif, de la couverture de la thérapie antirétrovirale chez les enfants et des soins postnatals et le pays continue à suivre les progrès des interventions mises en œuvre.

Légende

	Mesure accomplie
	Progrès
	Pas de progrès
	Résultat non encore échu.