


### Carte de Score pour la Redevabilité et l'Action



La population entière de la République du Congo court un risque élevé de contraction du paludisme. La transmission est intense toute l'année. Les nombres annuels déclarés s'élèvent à 183 026 cas de paludisme en 2013 et 2 870 décès.

#### Mesures

##### Politique et contrôle financiers

Situation de l'interdiction des monothérapies à base d'artémisinine par voie orale	
Prise en charge des cas au niveau communautaire (pneumonie)(2015)	
Prise en charge des cas au niveau communautaire (paludisme)(2015)	
Notation de la Banque mondiale concernant la gestion du secteur public et les institutions 2013 (CPIA groupe D)	2.5

##### Intrants financés, mise en œuvre et impact sur le paludisme

Prévisions de 2015 visant le financement des MILD par le secteur public (pourcentage du besoin)	0
Prévisions de 2015 visant le financement des TDR par le secteur public (pourcentage du besoin)	60
Prévisions de 2015 visant le financement des CTA par le secteur public (pourcentage du besoin)	60
Couverture opérationnelle MILD/PID (% population à risque)	9
En bonne voie en 2013 de réduire l'incidence du paludisme de >75 % d'ici 2015 (par rapport à 2000)	

##### Indicateurs traceur de santé maternelle et infantile

Couverture PTME 2013 (% femmes enceintes VIH+ recevant des ARV)	23
% des accouchements assistés par un accoucheur ou une accoucheuse compétente	94
Allaitement maternel exclusif (% enfants < 6 mois)	21
Couverture Vitamine A 2012(2 doses)	
Vaccins DTC3 2013 parmi les bébés de 12-23 mois	69
Soins postnataux (dans les 48 heures)	68

#### Légende

	Cible atteinte ou sur la bonne voie
	Progrès mais efforts supplémentaires requis
	Pas sur la bonne voie
	Sans données / Sans objet

### Progrès

Le Congo a instauré une politique de prise en charge communautaire des cas de paludisme et de pneumonie pour rapprocher de la population les services de traitement. Le pays a interdit la commercialisation de monothérapies à base d’artémisinine par voie orale. Le pays a réalisé de bons progrès au niveau d’interventions de SME témoins, concernant notamment le DPT3, l’assistance qualifiée à l’accouchement et les soins postnatals.

### Impact

Les nombres annuels déclarés s’élèvent à 183 026 cas de paludisme en 2013 et 2 870 décès.

### Problème principal

- Le manque de nouvelles ressources affectées au paludisme dans le Nouveau modèle de financement du Fonds mondial met en péril la capacité du pays à maintenir les acquis réalisés dans la lutte contre la maladie.

### Mesures clés recommandées précédemment

Objectif	Mesure	Délai d’accomplissement suggéré	Progrès	Commentaires - activités/accomplissements clés depuis le dernier rapport trimestriel
Optimiser la qualité des soins	Résoudre le problème d’affaiblissement de la couverture MILD	T2 2014		Sans rapport d’avancement
Résoudre la question du financement	Évaluer les implications de l’affectation insuffisante de fonds à travers le Fonds mondial et chercher à assurer l’affectation de ressources à la lutte contre le paludisme dans une mesure suffisante au maintien des acquis de ces dernières années	T3 2014		RBM va soutenir le Congo dans l’élaboration d’une stratégie de mobilisation des ressources
SMI <sup>1</sup> : Instaurer un changement de haut niveau en ce qui concerne les politiques et la stratégie	Identifier les raisons de l’affaiblissement de la couverture DPT3 et les résoudre	T2 2015		Sans rapport d’avancement

Le Congo a répondu favorablement aux mesures recommandées pour résoudre le problème de la faible couverture PTME et de l’allaitement maternel exclusif, ainsi que du manque de données concernant la vitamine A. Le pays continue à suivre les progrès des interventions mises en œuvre

### Légende

	Cible atteinte ou sur la bonne voie
	Progrès mais efforts supplémentaires requis
	Pas sur la bonne voie
	Sans données / Sans objet

<sup>1</sup> Mesures SMI, mesures recommandées et réponse suivies par OMS MCA/iERG.