


Carte de Score pour la Redevabilité et l'Action



La transmission du paludisme se produit toute l'année en Côte d'Ivoire, bien qu'elle soit plus saisonnière dans le nord du pays. Les nombres annuels déclarés s'élèvent à 3 471 024 cas de paludisme en 2016 et 3 340 décès.

Mesures

Produits de base : financement et contrôle budgétaire	
Prévisions de 2017 visant le financement de MILD (pourcentage du besoin)	100
Prévisions de 2017 visant le financement des TDR par le secteur public (pourcentage du besoin)	100
Prévisions de 2017 visant le financement des CTA par le secteur public (pourcentage du besoin)	95
Notation de la Banque mondiale concernant la gestion du secteur public et les institutions 2016 (CPIA groupe D)	3.2
Suivi de la résistance aux insecticides, mise en place et impact	
Cours sur les insecticides avec focus sur la résistance des moustiques dans des sites sentinelles représentatifs confirmés depuis 2010	4
Résistance aux insecticides suivie depuis 2015 et données déclarées à l'OMS	
Plan national de surveillance et de gestion de la résistance aux insecticides	
Échelle de mise en oeuvre de la PEC-C (2016)	
Couverture opérationnelle MILD/PID (% population à risque)	100
Changement estimé du taux d'incidence du paludisme (2010–2016)	
Indicateurs témoins de la santé maternelle et infantile et des MTN	
Couverture du traitement de masse contre les maladies tropicales négligées (indice MTN, %) (2016)	68
Estimation du pourcentage de la population atteinte du VIH et ayant accès à la thérapie antirétrovirale (2016)	41
Estimation du pourcentage d'enfants (0 à 14 ans) atteints du VIH et ayant accès à la thérapie antirétrovirale (2016)	25
% des accouchements assistés par un accoucheur ou une accoucheuse compétente	59
Soins postnataux (dans les 48 heures)	70
Allaitement maternel exclusif (% enfants < 6 mois)	12
Couverture Vitamine A 2015(2 doses)	72
Vaccins DTC3 2016 parmi les bébés de 0-11 mois	96

Légende

	Cible atteinte ou sur la bonne voie
	Progrès mais effort supplémentaire requis
	Pas en bonne voie
	Sans données
	Non applicable

## Paludisme

### Progrès

La Côte d'Ivoire a réussi à mobiliser les ressources nécessaires au financement du nombre de MILD, TDR et CTA requis en 2017 et s'est assuré un approvisionnement suffisant en MILD pour atteindre la couverture universelle en 2017. Le pays a également élargi la mise en œuvre de la PCCi et atteint la couverture opérationnelle universelle des MILD. La Côte d'Ivoire a amélioré considérablement ses mécanismes de suivi et de redevabilité par la mise au point d'une Carte de score pour le contrôle et l'élimination du paludisme.

### Impact

Les nombres annuels déclarés s'élèvent à 3 471 024 cas de paludisme en 2016 et 3 340 décès.

### Problème principal

- Assurer les ressources de programmation antipaludique à plus long terme.

### Mesures clés recommandées précédemment

Objectif	Mesure	Délai d'accomplissement suggéré	Progrès	Commentaires - activités/ accomplissements clés depuis le dernier rapport trimestriel
Résoudre la question du financement.	Accélérer la signature de la subvention du FM.	T4 2017		Le pays a rempli les conditions requises pour l'approbation de la subvention.

La Côte d'Ivoire a répondu favorablement à la mesure recommandée concernant la surveillance de la résistance nationale aux insecticides

## SMI et MTN

### Progrès

Le pays a réalisé des progrès au niveau des interventions témoins de la SMI relative au DTC3. La Côte d'Ivoire a amélioré considérablement ses mécanismes de suivi et de redevabilité par la mise au point d'une carte de Score de Santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et adolescente.

Les progrès réalisés sur le plan des maladies tropicales négligées (MTN) en Côte d'Ivoire se mesurent au moyen d'un indice composite calculé d'après la couverture de la chimiothérapie préventive atteinte pour l'onchocercose, la schistosomiase, les géohelminthiases et le trachome. La couverture de la chimiothérapie préventive en Côte d'Ivoire est élevée pour l'onchocercose (95 %), la schistosomiase (84 %) et les géohelminthiases (85 %). Elle est de 32 % pour le trachome. Globalement, l'indice de couverture de la chimiothérapie préventive des MTN en Côte d'Ivoire en 2016 est de 68, en hausse nette par rapport à la valeur d'indice 2015 (11).





### Mesures clés recommandées précédemment

La Côte d'Ivoire a répondu favorablement à la mesure de SMI recommandée pour résoudre le problème de la faible couverture de l'allaitement maternel exclusif et accélérer la couverture des thérapies antirétrovirales chez les enfants. Le pays continue à suivre les progrès de l'intervention mise en œuvre.

## Nouvelle mesure clé recommandée

Objectif	Mesure	Délai d'accomplissement suggéré
Optimiser la qualité des soins.	Résoudre la couverture en baisse de la vitamine A.	T4 2018

### Légende

	Mesure accomplie
	Progrès
	Pas de progrès
	Résultat non encore échu