


Carte de Score pour la Redevabilité et l'Action



La transmission du paludisme se produit toute l'année en Côte d'Ivoire, bien qu'elle soit plus saisonnière dans le nord du pays. Les nombres annuels déclarés s'élèvent à 5 297 926 cas de paludisme en 2018 et 3 133 décès.

Mesures

Produits de base : financement et contrôle budgétaire	
Prévisions de 2019 visant le financement de MILD (pourcentage du besoin)	100
Prévisions de 2019 visant le financement des TDR par le secteur public (pourcentage du besoin)	100
Prévisions de 2019 visant le financement des CTA par le secteur public (pourcentage du besoin)	100
Notation de la Banque mondiale concernant la gestion du secteur public et les institutions 2018 (CPIA groupe D)	3.3
Suivi de la résistance aux insecticides, mise en place et impact	
Cours sur les insecticides avec focus sur la résistance des moustiques dans des sites sentinelles représentatifs confirmés depuis 2010	4
Résistance aux insecticides suivie depuis 2015 et données déclarées à l'OMS	
Plan national de surveillance et de gestion de la résistance aux insecticides	
Le pays déclare avoir lancé la campagne "Zéro Palu ! Je m'engage "	
Échelle de mise en oeuvre de la PEC-C (2017)	
Couverture opérationnelle MILD/PID (% population à risque)	100
En bonne voie de réduire l'incidence de ≥40 % d'ici 2020 (par rapport à 2015)	
En bonne voie de réduire la mortalité de ≥40 % d'ici 2020 (par rapport à 2015)	
Indicateurs témoins de la santé maternelle et infantile et des MTN	
Couverture du traitement de masse contre les maladies tropicales négligées (indice MTN, %) (2018)	21
Estimation du pourcentage de la population atteinte du VIH et ayant accès à la thérapie antirétrovirale (2018)	55
Estimation du pourcentage d'enfants (0 à 14 ans) atteints du VIH et ayant accès à la thérapie antirétrovirale (2018)	40
% des accouchements assistés par un accoucheur ou une accoucheuse compétente	74
Soins postnataux (dans les 48 heures)	80
Allaitement maternel exclusif (% enfants < 6 mois)	12
Couverture Vitamine A 2017(2 doses)	94
Vaccins DTC3 2018 parmi les bébés de 0-11 mois	82

Légende

	Cible atteinte ou sur la bonne voie
	Progrès mais effort supplémentaire requis
	Pas en bonne voie
	Sans données
	Non applicable

Paludisme

Le Fonds mondial

Le Fonds mondial a annoncé que la Côte d'Ivoire recevra, pour la période 2021-2023, une allocation de 231,5 millions de dollars destinée au renforcement de ses systèmes de santé et de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Le Fonds mondial a déterminé le montant total de l'allocation en fonction de la charge de la maladie et du niveau de revenu du pays, entre autres facteurs. Une proportion spécifique du total est également affectée au composant paludisme, selon une formule mise au point par le Fonds mondial en fonction de différents facteurs, dont la charge de la maladie et les débours antérieurs. Pour la Côte d'Ivoire, ce montant est calculé à 132 millions de dollars. Les allocations aux composants de maladie individuels ne sont pas fixes et peuvent être ajustées suivant les décisions prises au niveau du pays. La Côte d'Ivoire est invitée à assurer l'affectation à la lutte contre le paludisme des ressources issues de son allocation globale du Fonds mondial ainsi que des ressources intérieures, pour accélérer le progrès.

Progrès

La Côte d'Ivoire a réussi à mobiliser les ressources nécessaires au financement des MILD, TDR et CTA en 2019 et s'est assurée un approvisionnement suffisant en MILD pour atteindre la couverture MILD opérationnelle universelle à 100 % de la population à risque ciblée. Le pays a également élargi la mise en œuvre de la PCCi. La Côte d'Ivoire a récemment présenté les résultats de ses tests de résistance aux insecticides à l'OMS. Le pays a réduit ses taux estimés d'incidence et de mortalité du paludisme de plus de 40 % depuis 2010. La Côte d'Ivoire a amélioré considérablement ses mécanismes de suivi et de redevabilité par la mise au point d'une Carte de score Paludisme.

Impact

Les nombres annuels déclarés s'élèvent à 5 297 926 cas de paludisme en 2018 et 3 133 décès.

Nouvelles mesures clés recommandées

Objectif	Mesure	Délai d'accomplissement suggéré
Impact	Rechercher et résoudre les raisons de la hausse d'incidence estimée du paludisme entre 2015 et 2018.	T4 2020
Résoudre la question du financement.	S'assurer que la demande de financement au FM a été soumise d'ici T2 2020 et assurer l'affectation de ressources à la lutte contre le paludisme à un niveau suffisant permettant le maintien des acquis de ces dernières années.	T2 2020

SRMNIA et MTN

Progrès

Le pays a progressé sur le plan de l'intervention témoin de la SRMNIA relative aux soins postnatals et a accru récemment sa couverture de la vitamine A et de la thérapie antirétrovirale. La Côte d'Ivoire a amélioré ses mécanismes de suivi et de redevabilité par la mise au point d'une carte de Score de Santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et adolescente.

Les progrès réalisés sur le plan des maladies tropicales négligées (MTN) en Côte d'Ivoire se mesurent au moyen d'un indice composite calculé d'après la couverture de la chimiothérapie préventive atteinte pour l'onchocercose, la schistosomiase, les

géo-helminthiases, la filariose lymphatique et le trachome. La couverture de la chimiothérapie préventive en Côte d'Ivoire est très bonne pour l'onchocercose (99 %), la schistosomiase (93 %) et la filariose lymphatique (74 %). Elle n'atteint cependant pas les cibles de l'OMS pour les géo-helminthiases (55 %) et elle n'a pas été mise en œuvre pour le trachome (0 %). Globalement, l'indice de couverture de la chimiothérapie préventive des MTN en Côte d'Ivoire en 2018 est de 21, en forte baisse par rapport à la valeur d'indice 2017 (75).

Mesure clé recommandée précédemment

La Côte d'Ivoire a répondu favorablement à la mesure de SRMNIA recommandée pour résoudre le problème de la faible couverture de l'allaitement maternel exclusif, et elle continue à suivre les progrès de l'intervention mise en œuvre.

Nouvelle mesure clé recommandée

Objectif	Mesure	Délai d'accomplissement suggéré
MTN	Mettre en œuvre la chimiothérapie préventive pour le trachome et chercher à l'accroître pour les géo-helminthiases en vue d'atteindre les cibles de l'OMS.	T4 2020