

بطاقة السجل الخاصة بالمساعدة والعمل

المقاييس

المعايير والرقابة المالية

وضع حظر العلاج الأحادي المرتكز إلى أرتيميسينين القم	
إدارة الحالة في المجتمع المحلي (الالتهاب الرئوي)(2015)	
إدارة الحالة في المجتمع المحلي (الملاريا)(2015)	
تصنيف البنك الدولي الخاص بإدارة القطاع العام والمؤسسات لعام 2014 (سياسة الدولة والتقييم المؤسسي الكتلة د)	3.2

السلع الممولة، التنفيذ وتأثير الملاريا

التصور الموضوع لعام 2015 بشأن تمويل التاموسيات المضادة للحشرات طويلة الأمد (% من الحاجة)	100
التصور الموضوع لعام 2015 بشأن قيام القطاع العام بتمويل اختبارات التشخيص السريع (% من الحاجة)	100
التصور الموضوع لعام 2015 بشأن قيام القطاع العام بتمويل العلاج الجامع المستند إلى مادة الأرتيميسينين (% من الحاجة)	100
التغطية التشغيلية للتاموسيات المبيدة للحشرات طويلة الأمد/ مضخات الرش الترسبي المتكرر داخل المباني (% من عدد السكان المعرضين للخطر)	14
على الطريق لتقليل حالات الإصابة بالملاريا بنسبة تتجاوز 75% بحلول عام 2015 (مقارنة بعام 2000)	

مؤشرات المتداولين لصحة الأم والطفل


تغطية عام 2014 الخاصة بمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل (نسبة المرضى من حاملي فيروس نقص المناعة البشرية الذين يتلقون الدواء المضاد للفيروس)	11
نسبة الولادات التي تتم بمساعدة قيلات التوليد من أصحاب المهارات	65
الرضاعة الطبيعية الخاصة (نسبة الأطفال من ذوي الأعمار دون 6 أشهر)	27
تغطية فيتامين أ 2012(جرعتان)	99
ثلاث جرعات من اللقاح الثلاثي الدفتيريا/السعال الديكي/الكزاز للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12-23 شهر (2013)	80
الغذية في مرحلة ما بعد الوضع (خلال 48 ساعة)	7

مفتاح الرسم البياني



تم تحقيق الهدف أو وضعه على المصدر الصحيح  
تم تسجيل تقدم تكن مطلوب بذل المزيد من الجهد  
ليس على المصدر الصحيح  
لا يوجد بيانات/لا ينطبق

نسبة انتشار طفيليات الملاريا (%)



في موريتانيا، تعتبر نسبة 15% تقريباً من السكان معرضة لخطر مرتفع من الإصابة بالملاريا بينما تعتبر نسبة 75% من السكان معرضة لخطر منخفض للإصابة بالملاريا. عام 2013، وصل عدد حالات الإصابة السنوية بمرض الملاريا المبلغ عنها إلى 128,486 حالة، مع 25 حالة وفاة.

## التقدم

منعت موريتانيا استيراد وبيع العلاج الأحادي المعتمد على مادة الأرتيميسينين وتبنت سياسة إدارة حالات الملاريا والالتهاب الرئوي في المجتمع المحلي (Community Case Management). ولقد أمنت الدولة تمويل كافي لشراء ما يلزم من الناموسيات المبيدة للحشرات طويلة الأمد (LLIN) والعلاج الثنائي المركز إلى مادة الأرتيميسينين (ACT) والاختبارات التشخيصية السريعة (RDT) خلال عام 2015. ولقد حققت الدولة تقدماً جيداً فيما يخص التدخل في تتبع مؤشر صحة الأم والوليد والطفل (MNCH) لتغطية فيتامين A كما زادت من تغطية التطعيم ضد الخناق والسعال الديكي والكزاز (DPT3).

## التأثير

في عام 2013، وصل عدد حالات الإصابة السنوية بمرض الملاريا المبلغ عنها إلى 128,486 حالة، مع 25 حالة وفاة.

## التحديات الأساسية

- انخفاض تغطية الناموسيات المبيدة للحشرات طويلة الأمد (LLINs).

## الإجراءات الأساسية الموصى بها سابقاً

الهدف	عناصر الإجراءات	الجدول الزمني المقترح لاستكمال العمل	التقدم	الملاحظات- الأنشطة/ الإنجازات الأساسية منذ التقرير ربع سنوي الأخير
صحة الأم والوليد والطفل <sup>1</sup> (MNCH <sup>1</sup> ): تحسين نوعية الرعاية إلى أقصى حد	أ) تحديد ومواجهة العوائق على الأصدقاء السياسية والبرامجية والإدارية التي تعرقل إحراز التقدم المنشود، بما فيها زيادة الاستثمارات المحلية والخارجية. العمل على ضمان الدمج بين خدمات منع انتقال الملاريا من الأم للطفل وخدمات الصحة الإنجابية وصحة الأم والوليد والطفل (RMNCH) وإتاحتها للجميع عن طريق إزاحة العقبات الكامنة مثل رسوم المستخدم وضمان أن تقوم الاستثمارات بزيادة وخلق الطلب على الخدمات المقدمة. ب) التحقيق في وتناول أسباب انخفاض تغطية الرضاعة الطبيعية الحصرية ج) العمل تجاه تحسين تغطية الرعاية بعد الولادة من خلال زيادة إتاحة الرعاية الماهرة، وتعزيز الولادة في المنشآت المخصصة حيث يتم متابعة الأم والأطفال لمدة 24 ساعة على الأقل قبل الانصراف ومن خلال الزيارات المنزلية من خلال عمال صحة المجتمع	الربع الأول من العام 2013		أشارت موريتانيا إلى وجود تغطية PMTCT بنسبة 11% في 2014. وتم إلغاء الرسوم المفروضة على المستخدمين في 4 أقاليم ومن المقرر تصعيد تلك المبادرة لتشمل جميع أنحاء الدولة بحلول عام 2015، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى زيادة تغطية مبادرة منع انتقال الملاريا من الأم للطفل.
		الربع الرابع من العام 2015		لم يحن موعد استحقاق النتائج بعد
		الربع الرابع من العام 2015		لم يحن موعد استحقاق النتائج بعد

استجابت موريتانيا سابقاً للإجراءات الموصى بها التي تتناول التغطية المنخفضة لمكافحة النواقل واستمرت في متابعة التقدم أثناء تنفيذ هذا الإجراء.

## مفتاح الرسم البياني

إنجاز العمل	
تم إحراز بعض التقدم	
لم يتم إحراز تقدم	
المخرجات لم يحن ميعادها بعد	

<sup>1</sup>مقاييس MNCH، يتم تتبع الإجراءات والاستجابة الموصى بها من خلال وحدة الأمومة، والطفل والمراهقين/مجموعة الخبراء المستقلة للمراجعة (MCA/iERG) في منظمة الصحة العالمية (WHO)