





بطاقة السجل الخاصة بالمساءلة والعمل



المقاييس

| السلع الممولة والرعاية المالية | |
|---|-----|
| التصور الموضوع لعام 2019 بشأن تمويل اللاموسيات المضادة للحشرات طويلة الأمد (% من الحاجة) | 100 |
| التصور الموضوع لعام 2019 بشأن قيام القطاع العام بتمويل اختبارات التشخيص السريع (% من الحاجة) | 100 |
| التصور الموضوع لعام 2019 بشأن قيام القطاع العام بتمويل العلاج الجامع المستند إلى مادة الأرتيميسينين (% من الحاجة) | 100 |
| تصنيف البنك الدولي الخاص بإدارة القطاع العام والمؤسسات لعام 2018 (سياسة الدولة والتقييم المؤسسي الكتل د) | |
| مراقبة مقاومة الحشرات والتكيف والأثر | |
| أصناف الحشرات المقاومة للبعوض في مواقع الرصد التمثيلية المؤكدة منذ عام 2010 | 3 |
| مقاومة المبيدات الحشرية التي تمت مراقبتها منذ العام 2015 والبيانات التي تم الإبلاغ عنها إلى منظمة الصحة العالمية | |
| الخطة الوطنية لإدارة ومراقبة مقاومة المبيدات الحشرية | |
| تطابق تنفيذ خطة إدارة ومراقبة مقاومة المبيدات الحشرية (2017) | |
| التغطية التشغيلية للحموسيات المبيدة للحشرات طويلة الأمد/مضخات الرش الترسيبي المتكرر داخل المباني (% من عدد السكان المعرضين للخطر) | 33 |
| تغير في تقييم الإصابات بالملاريا (2017-2010) | |
| تغير في تقييم معدلات الوفيات بالملاريا (2017-2010) | |
| مؤشرات التتبع لصحة الأم والطفل والأمراض المدارية المهملة (NTDs) | |
| تغطية شاملة لعلاج الأمراض المدارية المهملة (مؤشر % (2017) (NTD) | 40 |
| النسبة المئوية المقدرة % من إجمالي السكان المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والذين يحصلون على العلاج المضاد للفيروسات (2018) | 30 |
| النسبة المئوية المقدرة % من الأطفال (0-14 سنة) المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والذين يحصلون على العلاج المضاد للفيروسات (2018) | 14 |
| نسبة الولادات التي تتم بمساعدة قابلات التوليد من أصحاب المهارات العالية في مرحلة ما بعد الوضع (خلال 48 ساعة) | |
| الرضاعة الطبيعية الحصرية (نسبة الأطفال من ذوي الأعمار دون 6 أشهر) | 5 |
| تغطية فيتامين أ 2017 (جرعتان) | 11 |
| ثلاث جرعات من اللقاح الثلاثي النفتيريا/السعال الديكي/التهانج للطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0-11 شهر (2018) | 42 |

مفتاح الرسم



تم تحقيق النتائج أو يجري العمل على المسار
يوجد تقدم ولكن يحتاج الأمر للمزيد من الجهد
ليس على المسار
لا توجد بيانات
لا ينطبق

يتراوح انتقال مرض الملاريا من كونه غير مستقر ووبائي في بونتلاندا وصومالي لاند إلى كونه متوسط في وسط الصومال ومرتفع في الجنوب. في عام 2017، وصل عدد حالات الإصابة السنوية بمرض الملاريا المبلغ عنها إلى 37,156 حالة، و 20 حالة وفاة.

الملاريا

التقدم

وفرت الصومال الموارد الكافية لتغطية توريد وتوزيع الناموسيات المبيدة للحشرات طويلة الأمد (LLIN) والعلاج الثنائي المرتكز إلى مادة الأرتيميسينين (ART) والاختبارات التشخيصية السريعة (RDT) خلال عام 2019.

التحديات الرئيسية:

- ضعف الأنظمة الصحية وضعف عدد الشركاء نسبياً مما يحد من التدخلات الرئيسية لمكافحة الملاريا.

التأثير

بلغ عدد الحالات التي تم الإبلاغ عنها لحالات الإصابة بالملاريا في العام 2017 إلى 37,156 حالة مع 20 حالة وفاة.

الإجراءات الرئيسية السابقة الموصى بها

استجابت الصومال بإيجابية تجاه الإجراءات السابقة الموصى بها في التحقيق ومعالجة أسباب الزيادة في الحالات التقديرية للإصابة بالملاريا ومعدل الوفيات بين عامي 2010 و2017، وتستمر في متابعة التقدم أثناء تنفيذ هذا الإجراء.


مؤشر صحة الأم والوليد والطفل والأمراض الاستوائية المهملة

يُقاس التقدم في معالجة الأمراض الاستوائية المهملة (NTDs) في الصومال باستخدام المؤشر المركب الذي يتم حسابه من تغطية العلاج الكيميائي الوقائية التي تم تحقيقها للبلهارسيا، والديدان المنقولة من خلال التربة. تغطية العلاج الكيميائي الوقائي في الصومال جيدة لكلاً من البلهارسيا (51%) وبالنسبة للديدان المنقولة من خلال التربة (31%). وبصفة عامة، فإن مؤشر تغطية العلاج الكيميائي الوقائي للأمراض الاستوائية المهملة في عام 2017 هو 40، والذي يمثل زيادة كبيرة مقارنة بقيمة المؤشر عام 2016 وهي (0).

الإجراءات السابقة الموصى بها

| الأهداف | عنصر العمل | الإطار الزمني المقترح للإتمام | التقدم | التعليقات - الأنشطة/الإنجازات الرئيسية منذ آخر تقرير ربع سنوي |
|---|---|-------------------------------|--------|--|
| مؤشر صحة الأم والوليد والطفل (MNCH) ¹ : تعزيز جودة الرعاية | a) العمل على تسريع تغطية العلاج الثنائي المرتكز إلى مادة الأرتيميسينين (ART) لدى إجمالي السكان ولدى الأطفال بعمر أقل من 14 عاماً. | الربع الأول من العام 2017 | | تطلق الصومال حالياً وتنفذ سياسة "الاختبار والعلاج" والخيار B+ لتقديم خدمة PMTCT. يتم ذلك بناء القدرات، والتدريب، والإرشاد. فيما تعمل الدولة على توسيع نطاق إتاحة خدمات العلاج الثنائي المرتكز على مادة الأرتيميسين (ART) لدى البالغين والأطفال. ويتم تطوير الإرشادات المعملية والمساعدات |

¹مقاييس مؤشر صحة الأم والوليد والطفل ((MNCH)، الإجراءات الموصى بها ومتابعة الاستجابة من خلال وحدة الأمومة، والطفل والمراهقين (MCA) في منظمة الصحة العالمية (WHO).

| | | | | |
|--|---|---|---|--|
| <p>الوظيفية لدعم العلاج الثنائي المرتكز على مادة الأرتيميسين (ART). فيما يتم توسيع نطاق التدريبات لتعزيز تكامل العلاج الثنائي المرتكز على مادة الأرتيميسين (ART) لدى البالغين والأطفال ويتم توريد العلاج الثنائي المرتكز على مادة الأرتيميسين (ART) باستخدام موارد الصندوق الدولي. تزايدت التغطية بمقدار 3% لدى الأطفال و 4% لدى إجمالي السكان. لم يتم الإبلاغ عن أي تقدم.</p> <p>أشارت الدولة إلى زيادة طفيفة في تغطية فيتامين أ في العام 2017.</p> |  | <p>الربع الرابع من العام 2018</p> <p>الربع الثاني من العام 2019</p> | <p>(b) التحقيق في وتناول أسباب الانخفاض في قابلات الولادة المهرة.</p> <p>(c) التحقيق في وتناول أسباب الإشارة إلى الانخفاض في تغطية فيتامين أ.</p> | |
|--|---|---|---|--|

استجابت الصومال بإيجابية تجاه الإجراءات الموصى بها من RMNCAH والتي تتناول انخفاض تغطية وضعف بيانات عدد التدخلات الرئيسية بما يشمل قابلات الولادة المهرة، والرضاعة الطبيعية الحصرية، ورعاية ما بعد الولادة وتستمر في متابعة التقدم أثناء تنفيذ هذه الإجراءات.

مفتاح الرسم

| | |
|---|-------------------------------|
|  | تم إنجاز الإجراء |
|  | يوجد بعض التقدم |
|  | لا يوجد تقدم |
|  | لم يحن موعد تسليم النتائج بعد |